

SMITTSOM BUKHINNEBETENNELSE - felin infeksjøs peritonitt FIP

Årsaksforhold

Sykdommen forårsakes av et coronavirus. Viruset spres ved direkte kontakt, og ofte blir kattene smittet gjennom munn eller nese. Sykdomsutbrudd sees oftest der mange dyr er samlet på et sted. Virus og antistoffer danner immunkomplekser som forårsaker mange av symptomene ved sykdommen.

Symptomer

FIP rammer i hovedsak unge katter. Etter infeksjon kan katten utvikle to ulike former av FIP, en "våt" og en "tørr" form. Symptomene på den "våte" formen er økt bukomfang, pustebesvær og avmagring. Ved den "tørre" formen er symptomene mer diffuse og inkluderer avmagring, nedsatt matlyst, feber og fordøyelsesbesvær. Katter kan også være symptomfrie smittebærere. Prognosen for katter som har utviklet FIP er dårlig.

Vaksinasjon

Vaksinen gis som dråper i nesen, og kattungene vaksineres første gang når de er 15 uker gamle, med ny dose etter 3 uker. Vaksinen virker lokalt og gir økt beskyttelse i slimhinnen i luftveiene. Effekten av vaksinen er imidlertid ikke så god at den hindrer sykdomsutvikling helt.