

## **SMITTSOM LUFTVEISINFEKSJON - "katteinfluensa"**

### **Årsaksforhold**

Smittsomme luftveinsinfeksjoner hos katt forårsakes for det meste av to agens, kattens calicivirus og kattens herpesvirus. Dette er relativt vanlig forekommende sykdommer i Norge. Virus smitter ved kontakt mellom dyr, og sykdom sees oftest der mange dyr er samlet på et sted, som for eksempel i katterier og dyrepensjonat.

### **Symptomer**

Når katten smittes, vil virus infisere øvre luftveier, det vil si nesehule og luftrør. Dette forårsaker kraftige forkjølelssymptomer med hoste, neseflod, rennende øyne og feber, som kan vare i 10-20 dager. Calicivirus har en tendens til å spre seg til lungene og kan forårsake lungebetennelse. Ofte sees sårddannelser i munnhulen og på tunge. Sykdommene er sjelden dødelige. I noen tilfeller oppstår det i tillegg en bakteriell lungebetennelse som må behandles med antibiotika.

### **Vaksinasjon**

Kattungene bør vaksineres første gang når de er cirka 12 uker gamle og 3-4 uker deretter. Første revaksinering foretas ved ett års alder og deretter revaksineres årlig. Vaksinen gis i kombinasjon med vaksine mot andre sykdommer (blant annet kattepest).